

Acard 75mg x120 tabletek

Cena: 29,48 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	120 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	kwas acetylosalicylowy
Typ produktu	produkt leczniczy

Opis produktu

Skład:

Kwas acetylosalicylowy 75 mg

Właściwości i działanie:

Hamuje agregację płytek krwi. Specjalnie skonstruowana otoczka powoduje, że tabletkę rozpada się dopiero w jelicie cienkim, co pozwala ochronić śluzówkę żołądka i dwunastnicy przed podrażnieniem.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania preparatu Acard jest choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest zapobieganie agregacji krwinek płytkowych:

- zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka
- w niestabilnej chorobie wieńcowej
- u osób po przebytych już zawałach
- stan po wszczępieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej
- zapobieganie zatorom naczyń mózgowych u osób z migotaniem przedsionków
- u osób po przebytych udarach zatorowym mózgu
- u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na pochodne kwasu salicylowego
- uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. astma aspirynowa
- nie stosować u dzieci poniżej 15 roku życia chorych na zakażenia wirusowe, z uwagi na podejrzenie o powodowanie zespołu Rey'a
- nie stosować leku w ciąży
- choroba wrzodowa
- skaza krwotoczna, hemofilia, polipy nosa, trombocytopenia

Środki ostrożności:

Z uwagi na możliwość nadmiernej skłonności do krwawień, kwas acetylosalicylowy nie powinien być podawany na 5 - 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność stosując Acard, u chorych na astmę oskrzelową i inne choroby alergiczne, u osób ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, w niedoborze dehydrogenazy glukozy-6-fosforanu z uwagi na ryzyko hemolizy.

Dawkowanie:

Zwykle 75 lub 150 mg 1-2 razy na dobę lub co drugi dzień w czasie posiłku. Jeśli konieczne jest szybkie działanie antyagregacyjne, celowe jest rozpoczęcie leczenia od 300 mg dziennie przez 2 dni, a następnie zmniejszenie dawki do wartości 75 - 150 mg.

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Działanie niepożądane:

Kwas acetylosalicylowy podawany w małej dawce jest z reguły dobrze tolerowany przez chorych. Większość opisanych działań niepożądanych występowała po dawkach rzędu kilkuset do kilku tysięcy miligramów dziennie; nie można jednak wykluczyć, że objawy takie mogą wystąpić u osób wrażliwych po dawkach mniejszych.

Uczulenie na kwas acetylosalicylowy występuje najczęściej w wieku średnim, najczęściej u kobiet. Reakcje pojawiają się niezależnie od wielkości podanej dawki. Objawami uczulenia mogą być: nieżyt nosa, polipy nosa, skurcz oskrzeli, obrzęk naczyniowy, pokrzywka, eozynofilia. Niezależnie od tych objawów kwas acetylosalicylowy może spowodować tzw. astmę aspirynową, która jest przeciwwskazaniem do jego stosowania; rzadko trombocytopenia oraz niedokrwistość hemolityczną. Dolegliwość ze strony przewodu pokarmowego i krwawienia po niskich dawkach stosowanych dojelitowo występują bardzo rzadko.