

Desmoxan 1,5mg x100 tabletek

Cena: 63,96 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	100 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	tabletki
Substancja czynna	cytyzyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Desmoxan to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenia od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Działanie:

Lek zawiera substancję czynną cytyzynę której działanie podobne jest do nikotyny. Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego).

Dawkowanie:

Pierwsze 3 dni:

- 1 tabletkę co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek na dobę, jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.
- Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku. Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2-3 miesięcy.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

- Od 4 do 12 dnia – 1 tabletkę co 2,5 godziny (maksymalnie 5 tabletek na dobę)
- Od 13 do 16 dnia – 1 tabletkę co 3 godziny (maksymalnie 4 tabletki na dobę)
- Od 17 do 20 dnia – 1 tabletkę co 5 godzin (maksymalnie 3 tabletki na dobę)
- Od 21 do 25 dnia – 1 lub 2 tabletki na dobę.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Skład:

1 tabletkę zawiera 1,5mg cytyzyny

Przeciwwskazania:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
- Nie stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy.