

Difortan 100mg/g żel 100g

Cena: 23,99 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Podmiot odpowiedzialny	USP Zdrowie
Postać	żel
Substancja czynna	etofenamatu
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Wskazania

- miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni;
- stłuczeń;
- bólu pourazowego;
- łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów);
- łagodnego i umiarkowanego bólu stawów;
- miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien;
- umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego.

Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- ciąża;
- dzieci;
- miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy.

Skład

1 gram żelu zawiera 100mg etofenamatu

Sposób użycia

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Przed każdym użyciem i po każdym użyciu należy umyć ręce, chyba że bolesny obszar znajduje się na dłoniach.
- Lek jest przeznaczony do stosowania na nieuszkodzoną skórę, bezpośrednio na bolesny obszar.
- Podczas każdego stosowania należy użyć od około 2,5 do 5 cm żelu.
- Lek należy rozprowadzić na cały bolesny obszar, delikatnie wcierając.
- Difortan należy stosować u osób dorosłych w następujący sposób:
 - Leczenie urazów mięśni lub stawów, takich jak stłuczenia, naciągnięcia i zwichnięcia oraz zapalenie więzadeł - Od 3 do 4 aplikacji Difortan na dobę, przez 14 dni.
 - Leczenie chorób reumatycznych (reumatyzm), takich jak zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów - Od 2 do 3 aplikacji Difortan na dobę.
- Zmniejszenie bólu i (lub) stanu zapalnego powinno być odczuwalne po 3 lub 4 dniach leczenia lekiem Difortan.
- Nie stosować leku Difortan przez okres dłuższy niż 14 dni w przypadku urazów mięśni lub stawów lub 21 dni w przypadku zapalenia stawów i bólów stawów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy po 7 dniach terapii, należy skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leku Difortan.