

Ketonal Active 50mg x20 kapsułek



Cena: 21,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Sandoz
Postać	kapsułki
Substancja czynna	ketoprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 15 roku życia

Opis produktu

Wskazania:

Ketonal Active jest lekiem zawierającym ketoprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Produkt zalecany jest w leczeniu objawowym zapalnych oraz zwyrodnieniowych chorób reumatycznych układu kostnego. Działa również łagodząco na niektóre zespoły bólowe o umiarkowanym nasileniu, które towarzyszą reumatoidalnemu zapaleniu stawów czy chorobie zwyrodnieniowej stawów. Produkt wydawany bez recepty!

Właściwości:

Substancją czynną leku Ketonal Active jest ketoprofen. Jest to substancja, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ketoprofen posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Dzięki temu powszechnie się go stosuje w leczeniu objawów związanych z chorobami reumatycznymi układu kostnego, a także w łagodzeniu bólów różnego pochodzenia o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.

Skład:

- substancja czynna: ketoprofen (Ketoprofenum)
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy (E 131)

Jedna kapsułka to 50mg ketoprofenu.

Stosowanie:

- Lek Ketonal Active stosuj doustnie według zaleceń lekarza lub zgodnie z opisem na ulotce.
- Lek przyjmuj w trakcie posiłku, popijając wodą lub mlekiem (około 100ml).
- W niektórych przypadkach zaleca się równoczesne stosowanie leków zobojętniających kwas solny w żołądku.
- Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: jedna kapsułka trzy razy dziennie (rano, w południe, wieczorem).
- Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów: jedna kapsułka co 6 godzin.
- Leczenie bólu: jedna kapsułka co 6-8 godzin.
- Maksymalna dawka dobową ketoprofenu nie powinna przekraczać 200mg (cztery kapsułki).

Z uwagi na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.