

Polopiryna S 300mg x20 tabletek

Cena: 10,43 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	tabletki
Substancja czynna	kwas acetylosalicylowy
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi

Wskazania

Polopiryna S ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwapagregacyjne. Przyjmuje się ją w przeziębieniach, nerwobólach, chorobie reumatycznej, a także zapobiegawczo przeciw zakrzepicy. Substancją czynną preparatu jest kwas acetylosalicylowy. Preparat Polopiryna S należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z dużą ilością płynu. Tabletkę przed użyciem można również rozpuścić w 1/2 szklanki wody lub mleka.

Dawkowanie

Bóle o małym lub umiarkowanym nasileniu (ból głowy, zębów, mięśniowe, stawowe, nerwobóle), gorączka w przebiegu zakażeń:

- dorośli: 300–600 mg (1–2 tabletki) co 4 godziny, maksymalnie 3 g dziennie (10 tabletek dziennie);
- młodzież po 12. roku życia: 600–900 mg/d (2–3 tabletki dziennie).

Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, np. reumatoidalne zapalenie stawów:

- 600 mg (2 tabletki) 3–4 razy dziennie.

Gorączka reumatyczna:

- 900 mg (3 tabletki) 4 razy dziennie.

Zawał serca, wtórna profilaktyka zawału serca:

- 150–300 mg/dziennie (0,5–1 tabletki dziennie).

Skład:

1 tabletki zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.